

# Concordia

<b>Kartoffeln</b>		<b>Pommes de terre</b>
<b>Speisesorte</b>		<b>Variété de consommation</b>
<b>Reifegruppe</b>	früh bis mittelfrüh / précoce à mi-précoce	<b>Maturité</b>
<b>Züchter</b>	Europlant	<b>Obtenteur</b>
<b>Abstammung</b>	B 1019/2/95 x Jelly	<b>Ascendance</b>
<b>Aufnahme in die Sortenliste</b>	2017	<b>Inscription dans la liste suisse</b>
<b>Vertreter</b>	swissem Schweiz. Saatgutproduzenten-Verband/ Fédération suisse des producteurs de semences 1567 Delley	<b>Représentant</b>



1. Morphologische Merkmale		
<b>Knolle</b>	Form	kurzoval bis langoval
	Grösse	eher grossfallend
	Augen	flach
	Fleischfarbe	gelb
	Schale	gelb
<b>Stängel</b>	hoch, mittelaufrecht, ohne Pigmentierung	
<b>Blatt</b>	lanzettförmig, grün	
<b>Blüten</b>	weiss, selten	

1. Caractères morphologiques		
<b>Tubercule</b>	forme	oblongue courte à oblongue
	taille	plutôt grosse
	yeux	superficiels
	chair	jaune
	peau	jaune
<b>Tige</b>	de haute taille, mi-dressée, sans pigmentation	
<b>Feuille</b>	lancéolée, vert franc	
<b>Fleur</b>	blanche, rare	

# Concordia

## 2. Werteigenschaften

Ertrag	hoch	
Kalibrierausbeute	hoch	
Stärkegehalt	mittel (13–15%)	
Stärkeertrag	mittel	
Kochtyp	B	
Verfärbungen	roh gekocht	gering gering
Reduzierende Zucker		
Verarbeitungseignung	Hausfrites	
Vorkeimdauer	5–7 Wochen	
Primeur	10–12 Wochen	

## 2. Caractéristiques agronomiques et technologiques

Rendement	élevé	
Calibre commercial	élevé	
Teneur en amidon	moyenne (13–15%)	
Rendement amidon	moyen	
Type culinaire	B	
Altération de la couleur	chair crue chair cuite	faible faible
Sucres réducteurs		
Utilisation technologique	frites maison	
Prégermination	5–7 semaines	
Primeur	10–12 semaines	

## 3. Anfälligkeiten

Krebs	anfällig
Nematoden	nicht anfällig ( $Ro_{1,4}$ )
Krautfäule	stark
Knollenfäule	mittel
Flachschorf	mittel bis gering
Pulverschorf	mittel
Eisenfleckigkeit	gering
Blattrollvirus	gering
Virus Y	gering bis mittel
Schlagempfindlichkeit	gering bis mittel
Abkeimungsempfindlichkeit	mittel

## 3. Sensibilités

Galle verruqueuse	sensible
Nématodes	résistante ( $Ro_{1,4}$ )
Mildiou des fanes	élevée
Mildiou des tubercules	moyenne
Gale commune	moyenne à faible
Gale poudreuse	moyenne
Taches de rouille	faible
Virus de l'enroulement	faible
Virus Y	faible à moyenne
Sensibilité aux chocs	faible à moyenne
Sensibilité à l'égermage	moyenne

## 4. Besondere Hinweise

Die Knollen weisen eine mittlere bis lange Keimruhe auf.

## 4. Remarques particulières

Concordia a une dormance moyenne à prononcée.

Concordia ist eine mittelfrühe, eher grossfallende, gelbfleischige Speisesorte.

Concordia est une variété de consommation mi-précoce à chair jaune et aux tubercules plutôt gros.