


# Marabel

<b>Kartoffeln</b>		<b>Pommes de terre</b>
<b>Speisesorte</b>		<b>Variété de consommation</b>
<b>Reifegruppe</b>	früh/précoce	<b>Maturité</b>
<b>Züchter</b>	Böhm/Europlant	<b>Obtenteur</b>
<b>Abstammung</b>	NENE x M 75-364	<b>Ascendance</b>
<b>Aufnahme in die Sortenliste</b>	2017	<b>Inscription dans la liste suisse</b>
<b>Vertreter</b>	swissem Schweiz. Saatgutproduzenten-Verband/ Fédération suisse des producteurs de semences 1567 Delley	<b>Représentant</b>



1. Morphologische Merkmale		
<b>Knolle</b>	Form	kurzoval bis langoval, regelmässig
	Grösse	mittel
	Augen	flach bis mittelflach
	Fleischfarbe	gelb bis tiefgelb
	Schale	gelb
<b>Stängel</b>	klein, deckend, Stängelbasis pigmentiert	
<b>Blatt</b>	hellgrün	
<b>Blüten</b>	rotviolett, mittelblühend	

1. Caractères morphologiques		
<b>Tubercule</b>	forme	oblongue courte à oblongue, régulière
	taille	moyenne
	yeux	superficiels à mi-superficiels
	chair	jaune à jaune foncé
	peau	jaune
<b>Tige</b>	de petite taille, étalée, pigmentation à la base des tiges	
<b>Feuille</b>	vert clair	
<b>Fleur</b>	rouge violacé, moyenne	

# Marabel

## 2. Werteigenschaften

<b>Ertrag</b>	mittel bis hoch	
<b>Kalibriererausbeute</b>	mittel bis hoch	
<b>Stärkegehalt</b>	niedrig (10–13%)	
<b>Stärkeertrag</b>	niedrig	
<b>Kochtyp</b>	B–A	
<b>Verfärbungen</b>	roh	gering
	gekocht	gering
<b>Reduzierende Zucker</b>	ziemlich hoch (2,36% TS)	
<b>Verarbeitungseignung</b>	keine	
<b>Vorkeimdauer</b>	4–5 Wochen	
<b>Primeur</b>	8–9 Wochen	

## 2. Caractéristiques agronomiques et technologiques

<b>Rendement</b>	moyen à élevé	
<b>Calibre commercial</b>	moyen à élevé	
<b>Teneur en amidon</b>	faible (10–13%)	
<b>Rendement amidon</b>	faible	
<b>Type culinaire</b>	B–A	
<b>Altération de la couleur</b>	chair crue	faible
	chair cuite	faible
<b>Sucres réducteurs</b>	assez élevés (2,36% MS)	
<b>Utilisation technologique</b>	néant	
<b>Prégermination</b>	4–5 semaines	
<b>Primeur</b>	8–9 semaines	

## 3. Anfälligkeiten

<b>Krebs</b>	anfällig
<b>Nematoden</b>	nicht anfällig (Ro <sub>1,4</sub> )
<b>Krautfäule</b>	stark
<b>Knollenfäule</b>	mittel bis gering
<b>Flachschorf</b>	gering
<b>Pulverschorf</b>	stark
<b>Eisenfleckigkeit</b>	gering
<b>Blattrollvirus</b>	mittel
<b>Virus Y</b>	gering
<b>Schlagempfindlichkeit</b>	gering
<b>Abkeimungsempfindlichkeit</b>	leicht anfällig

## 3. Sensibilités

<b>Galle verruqueuse</b>	sensible
<b>Nématodes</b>	résistante (Ro <sub>1,4</sub> )
<b>Mildiou des fanes</b>	élevée
<b>Mildiou des tubercules</b>	moyenne à faible
<b>Gale commune</b>	faible
<b>Gale poudreuse</b>	élevée
<b>Taches de rouille</b>	faible
<b>Virus de l'enroulement</b>	moyenne
<b>Virus Y</b>	faible
<b>Sensibilité aux chocs</b>	faible
<b>Sensibilité à l'égermage</b>	peu sensible

## 4. Besondere Hinweise

Die Knollen weisen eine mittlere Keimruhe auf.

## 4. Remarques particulières

Marabel a une dormance moyenne.

Marabel ist eine frühe, ziemlich festkochende Sorte.

Marabel est une variété précoce, assez ferme.